

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка №: 12001004 Назва сорту Гамбіт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 23.01.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	коротке	3
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	мало	3
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за шириною	вузький	3
17	Прилисток: за розміром	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	коротка	3
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5
24	Час цвітіння	пізній	7
25	Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	середня	5
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5
31	Квітка: ширина чашолистка	вузька	3
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконіжка: кількість приквітков	середня кількість	2
37	Біб: за довжиною	короткий	3
38	Біб: за шириною	вузький	3
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	мало	3
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	еліптична	1
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1

50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіннина: забарвлення рубчика	темніше за насінну шкірку	2
56	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 1	наявна	9
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 5	наявна	9
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 6	наявна	9
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	наявна	9
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,0	29,5	32,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га	1,4	0,9	4,8
Гарантована різниця до національного стандарту, %	8,0	3,1	17,6
Вегетаційний період, днів	77	76	84
Висота рослин, см.	59,9	68,0	93,5
Маса 1000 насінин, г	217,6	218,5	219,5
Стійкість до полягання, б	8,6	8,5	7,9
Стійкість до осипання, б	8,6	8,3	8,0
Стійкість до посухи, б	6,8	8,2	8,5
Стійкість до пероноспорозу, б	8,6	8,2	7,7
Стійкість до корневих гнилей, б	8,8	7,9	8,7
Стійкість до аскохітозу, б	8,4	8,3	8,8
Стійкість до антракнозу, б	8,5	8,3	9,0
Вміст білку, %	24,4	22,6	24,0

Напрямок використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся