

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка №: 12027002 Назва сорту Ц ЗЕРО

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.01.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	триплоїд	3
2	Сім'ядолі: форма	широко-еліптична	3
3	Сім'ядолі: за розміром	великі	7
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Сім'ядолі: наявність плям	відсутні	1
6	Рослина: довжина міжвузлів	короткі	3
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	довга	7
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильна	7
13	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	слабка	3
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: за розміром (під час цвітіння)	середня	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	мала	3
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
21	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від світлого до помірного	4
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	маленький	3
24	Плід: увігнутість основи	мілка	3
25	Плід: форма апікальної частини	від плескатої до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: ступінь борозенчастості	відсутня	3
30	Плід: смуги	наявні	9
31	Плід: характер смуг	чітко визначені	2
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	темне	7
33	Плід: ширина смуг	вузькі	3
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: товщина зовнішнього шару оплодня	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірне	5
38	Плід: твердість м'якоті	помірна	5
39	Плід: кількість насінин	відсутні або мало	1
40	Сім'янка: за розміром	ознака не визначається	0
41	Насінина: основний колір оболонки	ознака не визначається	0
42	Насінина: вторинний колір оболонки	ознака не визначається	0
43	Насінина: характер розміщення вторинного кольору оболонки	ознака не визначається	0
44	Насінина: відношення зони рисунка до основного забарвлення	ознака не визначається	0
45	Сім'янка: плями біля рубця	ознака не визначається	0
46	Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки)	середній	5
47	Початок досягання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Паса 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Паса 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Паса 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Паса 1	ознака не визначалась	0

49.2	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted: Pasa 2	ознака не визначалась	0
49.3	Стійкість до Colletotrichum lagenarium passerini) Ellis et Halsted: Pasa 3	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 6 т/га, період від повних сходів до першого збирання 105 діб, період від садіння 30-денної розради до останнього збирання 75 діб, вміст загального цукру 13%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.