

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.

Заявка №: 10046001 Назва сорту Ольжич

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140475

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|---------------------------|-----|
| 1 | Клубочок: тип ростковості | одноростковий | 1 |
| 2 | Рослина: плоідність | диплоїд | 2 |
| 3 | Гіпокотиль: колір | жовтий | 3 |
| 4 | Листок: положення | напівпрямостояче | 3 |
| 5 | Листок: за довжиною (черешок включно) | середній | 5 |
| 6 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 7 | Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина | середнє | 5 |
| 8 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 9 | Листкова пластинка: забарвлення жилок | біле | 1 |
| 10 | Листкова пластинка: форма кінчика | злегка округла | 2 |
| 11 | Черешок: за довжиною | середній | 5 |
| 12 | Черешок: забарвлення основи | від жовтого до оранжевого | 2 |
| 13 | Коренеплід: за формою | яйцеподібний | 3 |
| 14 | Коренеплід: за довжиною | середній | 5 |
| 15 | Коренеплід: за шириною | середній | 5 |
| 16 | Коренеплід: відношення довжина/ширина | середнє | 5 |
| 17 | Коренеплід: заглибленість у ґрунт | глибока | 7 |
| 18 | Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту | жовте | 3 |
| 19 | Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті | жовте | 3 |
| 20 | Коренеплід: вміст сухої речовини | середній | 5 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 86,1 | 82,3 | 73,3 |
| Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га | 16,8 | 16,1 | 5,3 |
| Гарантована прибавка (до національного стандарту), % | 24,2 | 24,3 | 7,7 |
| Урожай коренеплодів, ц/га | 688,0 | 579,6 | 560,1 |
| Маса коренеплодів, г | 985,8 | 777,9 | 756,1 |
| Вміст сухої речовини, % | 13,8 | 16,2 | 14,4 |
| Днів до досягання | 162 | 154 | 149 |
| Ступінь заглиблення в ґрунт, б | 5,0 | 5,9 | 5,1 |
| Густота стояння, тис. шт/га | 68,1 | 77,2 | 70,1 |
| Процент стрілкуючих | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Стійкість до церкоспорозу, б | 6,6 | 7,0 | 5,4 |
| Лежкість, % | - | 83 | - |
| Ураженість коренеїдом, б | 2,4 | 2,2 | 1,0 |
| Придатність до механізованого збирання, б | 7,4 | 6,2 | 5,7 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп