

Вид: Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L.

Заявка №: 10007001 Назва сорту Конка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.01.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140633

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптіль: ступінь антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Рослина: форма куца (габітус) | прямостоячий | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | помірно | 5 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | раннє | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною | середній | 5 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | слабке | 3 |
| 18 | Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) | вузьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча | скошене | 1 |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | середній | 5 |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця | середньо зігнутий | 5 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: колір | червоний | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | помірне | 5 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | велике | 7 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 |
| 32 | Нижня квітова луска : кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овально-ланцетна | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------|----------|-------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 49,5 | 60,6 | 52,8 |
| +, - до нац. ст., ц/га | 1,8 | 1,0 | -0,7 |
| % | 3,8 | 1,7 | -1,3 |
| Максим. урожайність, ц/га | | 100,9 | |
| Вегетаційний період, днів | 262 | 274 | 280 |
| Висота рослин, см | 68 | 77 | 77 |
| Маса 1000 зерен, г | 37,9 | 40,5 | 41,9 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 7,4 | 8,0 | 8,8 |
| Стійкість до, бал: полягання | 9,0 | 8,5 | 8,5 |
| осипання | 8,9 | 8,2 | 8,6 |
| посухи | 8,0 | 7,7 | 8,4 |
| борошнистої роси | 7 | 7 | 7 |
| бурої іржі | 9 | 7 | 7 |
| фузаріозу | 7 | 7 | 9 |
| Вміст білку, % | 14,0 | 13,2 | 14,1 |
| Вміст клейковини, % | 29,6 | 28,7 | 29,4 |

| | | | |
|---------------------|------|------|-----|
| W, о.а. | 312 | 309 | 265 |
| Об'єм хліба, мл | 1230 | 1000 | 990 |
| Напряв використання | с | ц | ц |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп