

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 10016026 Назва сорту ПТ207

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.06.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140780

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,2	32,2	25,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,0	6,2	0,9
Прибавка до національного стандарту, %	0,0	23,9	3,6
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-4,0	0,2	-4,0
Прибавка до умовного стандарту, %	-17	1	-13
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,4	8,8
Стійкість до посухи, бал	7,8	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,3	7,0	6,9
Зимостійкість, бал	5,1	7,5	8,3
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		49,5	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		5,4	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	45,0	46,4	47,4
Вміст білку, %	23,2	22,0	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,0
Вміст глікозинолатів, %	0,8	0,7	0,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся