

Вид: Індау посівний *Eruca sativa* Mill.

Заявка № 18500001 Назва сорту: Спаркл **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190940

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків	напівпохиле	3
3	Молода рослина: щільність розетки	не щільна	3
4	Молода рослина: за висотою	середня	5
5	Листок: за формою	не розсічений	1
6	Тільки для сортів з розсіченими на частки листками. Листок: кількість часток	мало	3
7	Листок: за товщиною пластинки	середній	5
8	Листок: за довжиною	короткий	3
9	Листок: за шириною	широкий	7
10	Листок: черешок за довжиною	короткий	3
11	Листок розетковий: товщина черешка	середній	5
12	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Стебло: положення	похиле	2
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
15	Тільки для сортів з наявним антоціановим забарвленням. Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
16	Стебло: гілкування	слабке	3
17	Стебло: інтенсивність опушення	слабке	3
18	Стебло: за товщиною (на рівні ґрунту)	середнє	5
19	Квітка: забарвлення на початку цвітіння	білувате	1
20	Квітка: щільність фіолетового жилкування пелюсток	щільне	7
21	Стручок: довжина носика	середній	5
22	Стручок: за довжиною (від плодоніжки до основи носика)	середній	5
23	Час початку цвітіння	ранній	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрямок використання: 1 – зелені листки. Товарна врожайність, т/га – 18. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 30. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 13, йоду, мг/100 г – 7, заліза, мг/100 г – 0,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe cichoracearum* DC.) – 5; плямистість темно-оливкова (*Alternaria* ssp.) – 4; церкоспороз (*Cercospora* ssp.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.