

Вид: Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida* hort.

Заявка № 17498003 Назва сорту: Агора **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.06.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190949

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	компактний	1
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залістяність	відсутня	1
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	1
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	середній	4
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	трикутна	2
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	червоне	4
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвіттини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	коричнево-пурпурове	26
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	зелено-коричневе	47
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	коричнево-пурпурове	26
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	зелено-коричневе	47
30	Квітка: візерунок	відсутній	1
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвіттини	ознака не визначається	0
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвукольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвукольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітнина: відносне розташування часток	напівдотичне	2
38	Оцвітнина: розташування внутрішніх часток відносно площини квіткі	горизонтальні	2
39	Оцвітнина: розташування зовнішніх часток відносно площини квіткі	слабо або сильно відігнуті донизу	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	тупа	4
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла	2
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвилястий	2
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвіттини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7
48	Тичинка: основне забарвлення	коричнево-червоне	25
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5
53	Стовпчик: основне забарвлення	коричнево-червоне	25
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	коричнево-червоне	25
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 65. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 98. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 19. Тривалість цвітіння рослини, діб – 22. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Декоративність, бал (1–99) – 90. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 98. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*), павутинний кліщ (*Arachnids*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium*, *Phytophthora*, *Sclerotium*, *Rhizoctonia*, *Pythium*), хлороз (*Chlorosis*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.