

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 12035011 Назва сорту Вагнер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140622

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	дуже мале	1
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	сильна	3
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кутаста	3
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: зморшкуватості	дуже слабка	1
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	високо стійкий	3
46	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка ( <i>CVYV</i> )	відсутня	1
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка ( <i>ZYMV</i> )	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

\*Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 47діб, вміст сухої речовини в плоді 4,1%.

\*Дані надані заявником.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт