

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115001 Назва сорту Емперадор

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140630

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже великий	9
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	дуже маленький	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	тільки 2	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	маленький	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	дуже короткий	1
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	відсутня	1
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	відсутня	1

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	відсутня	1
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	відсутня	1
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	відсутня	1
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	відсутня	1
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

\*Маса товарного плоду 37 г, період від повних сходів до початку дозрівання 87 діб, період плодоношення 60 діб, вміст сухої речовини в плоді 6 %, вміст загального цукру 4 %, вміст вітаміну С 17%.

\*Дані надані заявником.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт