

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 10038001 Назва сорту Мереп'яночка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.01.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140720

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня кількість	5
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	глибокі	7
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багряний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоти	магнове біле	2
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

\*Товарна урожайність 26,5 т/га, середня маса плоду 45 г, тривалість періоду до досягання 23 доби, вміст сухої речовини 5,5 %.

\*Дані надані заявником.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Лісостеп