

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.

Заявка №: 09046005 Назва сорту Стармон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	триплоід	3
3	Гіпокотиль: колір	жовтий	3
4	Листок: положення	напівпрямостояче	3
5	Листок: за довжиною (черешок включно)	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: забарвлення жилок	біле	1
10	Листкова пластинка: форма кінчика	злегка округла	2
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
13	Коренеплід: за формою	конічний	5
14	Коренеплід: за довжиною	середній	5
15	Коренеплід: за шириною	середній	5
16	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Коренеплід: заглибленість у ґрунт	середня	5
18	Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту	зелене	2
19	Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті	жовте	3
20	Коренеплід: вміст сухої речовини	високий	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	75,4	89,1	72,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	14	12,3	-3,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	23	16	-5
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	1,1	9,5	-8,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	2	12	-10
Урожай коренеплодів, ц/га	592,2	597,5	485,6
Маса коренеплодів, г	818,4	817,8	615,8
Вміст сухої речовини, %	13,6	17	15,5
Днів до достигання	162,6	152	151,9
Ступінь заглиблення в ґрунт, б	5,2	5,1	5,3
Густота стояння, тис. шт/га	76	81	76,6
Процент стрілкуючих	0	0	0
Стійкість до церкоспорозу, б	7,8	7,2	5,3
Лежкість, %	-	65,3	-
Ураженість коренієм, б	1	2,4	2,3
Придатність до механізованого збирання, б	7,4	6,8	5,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся