Вид: Лілійник гібридний Hemerocallis hybrida hort.
Заявка №: 11467003 **Назва сорту** Сливовий Коктейль
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.04.2014 **Патент №:** 140777
Дата пріоритету 30.05.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.04.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 140956

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	міцно спляча	1
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: за формою	розлога	2
6	Листок: положення у просторі	пониклий біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	світло-зелене	1
10	Генеративний пагін: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Генеративний пагін: залистяність	відсутні листки	1
12	Суцвіття: за формою	щільне	9
13	Суцвіття: за наявністю приквітків	без приквітків	1
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час початку цвітіння	середньоранній	3
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	тривале	7
19	Квітка: кількість на рослині	багато	7
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	багато	7
21	Квітка: за діаметром	середня	5
22	Квітка: за повнотою	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: за формою	зіркоподібна	3
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожева	3
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	коричнево-пурпуровий	26
27	Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	сіро-зелений	6
28	Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	коричнево-пурпуровий	26
29	Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	сіро-зелений	6
30	Квітка: візерунок	середня лінія	8
31	Квітка: основний колір рисунка на частках оцвітини	оранжево-рожевий	15
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: Квітка: вторинний колір	ознака не визначалась	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинний колір	ознака не визначалась	0
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: перший колір	ознака не визначалась	0
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинний колір	ознака не визначалась	0
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітина: відносне розташування часток	напівдотичні	2
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	тупа	4
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрований	3
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1
44	Квітка: фактура внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	зморшкувата	2
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	довга	2
47	Квітка: довжина тичинки	довга	7
48	Тичинка: основний колір	фіолетовий	28
49	Тичинка: колір пиляків	пурпуровий	4
50	Пилок: забарвлення	рожево-коричневе	6

51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	високий	7
53	Стовпчик: основний колір	жовто-зелений	5
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	жовто-зелений	5
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетаційного періоду 205 днів. Від початку вегетації до початку цвітіння 87 днів, тривалість цвітіння 45 днів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Степ