

Вид: Соя культурна  
Glycine max. (L.) Merr.

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Танаїс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 120174

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110485

| №  | Ознака  | Проявлення                    | Код |
|----|---|-------------------------------|-----|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилію                                     | відсутнє                      | 1   |
| 2  | Рослина: тип розвитку   | детермінантний                | 1   |
| 3  | Рослина: ступінь завивання стебла   | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 4  | Рослина: за формою куща (градуси)   | напівстиснута 21-40           | 3   |
| 5  | Рослина: наявність опушення   | наявне                        | 9   |
| 6  | Рослина: забарвлення опушення   | жовто-коричневе               | 2   |
| 7  | Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки)                             | середня 71-90 см              | 5   |
| 8  | Стебло: кількість вузлів  | середня кількість 10-15 шт.   | 5   |
| 9  | Стебло: наявність фасціації   | відсутня                      | 1   |
| 10 | Стебло: за товщиною, мм   | тонке < 7,0                   | 3   |
| 11 | Листок: ступінь пухирчастості   | помірна                       | 5   |
| 12 | Середній листочок: за формою  | овальний                      | 3   |
| 13 | Середній листочок: форма верхівки   | загострена                    | 1   |
| 14 | Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення                                     | помірний                      | 5   |
| 15 | Середній листочок: розмір   | середній                      | 5   |
| 16 | Квітка: забарвлення віночка   | фіолетове                     | 2   |
| 17 | Біб: забарвлення  | коричневе                     | 4   |
| 18 | Біб: за довжиною, мм  | середній 40,1-50,0            | 5   |
| 19 | Біб: за шириною, мм   | вузький < 9,0                 | 3   |
| 20 | Біб: за формою  | серповидний                   | 3   |
| 21 | Насіння: за масою 1000 зерен, г   | середнє 131-190               | 5   |
| 22 | Насінина: за формою   | овально-видовжена             | 4   |
| 23 | Насінина: за основним забарвлення оболонки  | жовта                         | 1   |
| 24 | Насінина: забарвлення рубчика   | жовте                         | 2   |
| 25 | Насінина: форма рубчика   | лінійний                      | 1   |
| 26 | Насінина: наявність вічка на рубчику  | наявне                        | 9   |
| 27 | Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика                                 | наявний                       | 9   |
| 28 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою) | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 29 | Рослина: час досягання  | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 30 | Рослина: обпадання листя після досягання  | наявне                        | 9   |