

Вид: Картопля

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Solanum tuberosum L.

Назва сорту: Псельська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 27.03.2012 Патент №: 120045

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110294

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|-------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: за розміром | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: за формою | круглий | 1 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | дуже сильна | 9 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | велике | 3 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 |
| 7 | Світловий паросток: характеристика верхівки | проміжна | 3 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | сильне | 7 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | слабе | 3 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | декілька | 3 |
| 11 | Світловий паросток: довжина бічних пагінців | середні | 5 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | проміжний | 2 |
| 13 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | слабе | 3 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: відкритість | проміжний | 3 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 |
| 18 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | темне | 7 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: за розміром | малі | 3 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною | вузькі | 3 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | середньо | 5 |
| 23 | Листочок: хвилястість краю | помірна | 5 |
| 24 | Листочок: глибина жилок | глибоке | 7 |
| 25 | Листочок: глянуватість верхнього боку | помірно глянуватий | 5 |
| 26 | Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки | наявна | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | слабе | 3 |
| 28 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння | рясне | 7 |
| 30 | Суцвіття: за розміром | середнє | 5 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку | помірне | 5 |

| | | | |
|----|--|-------------------|---|
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | середнє | 2 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | середнє | 5 |
| 36 | Рослина: час досягання | пізній | 7 |
| 37 | Бульба: форма | видовженооувальна | 4 |
| 38 | Бульба: глибина вічок | середні | 5 |
| 39 | Бульба: колір шкірки | жовтий | 2 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | світло-жовте | 3 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | помірне | 5 |