

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 12073002 Назва сорту Мальбек

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140376

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення  | Код |
|----|---|---|-----|
| 1  | Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)                                  | середній  | 5   |
| 2  | Молодий пагін: відкритість верхівки   | повністю відкрита   | 5   |
| 3  | Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці   | помірні   | 5   |
| 4  | Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці                               | слабке  | 3   |
| 5  | Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці  | слабке  | 3   |
| 6  | Молодий листок: колір верхнього боку пластинки  | зелений   | 2   |
| 7  | Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки                   | помірні   | 5   |
| 8  | Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки                        | густі   | 7   |
| 9  | Пагін: положення в просторі   | напівпряме  | 3   |
| 10 | Пагін: колір дорсального боку міжвузлів   | зелений   | 1   |
| 11 | Пагін: колір вентрального боку міжвузлів  | зелений   | 1   |
| 12 | Пагін: колір дорсального боку вузлів  | зелений   | 1   |
| 13 | Пагін: колір вентрального боку вузлів   | зелений   | 1   |
| 14 | Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях   | відсутні або дуже рідкі   | 1   |
| 15 | Пагін: довжина вусиків  | середні   | 5   |
| 16 | Квітка: статеві органи  | добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка                   | 3   |
| 17 | Розвинений листок: за розміром пластинки  | середній  | 5   |
| 18 | Розвинений листок: форма пластинки  | п'ятикутна  | 3   |
| 19 | Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки  | помірна   | 5   |
| 20 | Розвинений листок: кількість лопатей  | три   | 2   |
| 21 | Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)                                  | неглибокі   | 3   |
| 22 | Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів | відкрите  | 1   |
| 23 | Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка  | широко відкрите   | 2   |
| 24 | Розвинений листок: довжина зубців   | короткі   | 3   |
| 25 | Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців  | мале  | 3   |
| 26 | Розвинений листок: форма зубців   | посадження зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими | 5   |
| 27 | Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки               | слабке  | 3   |
| 28 | Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки                 | помірні   | 5   |
| 29 | Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки                      | рідкі   | 3   |
| 30 | Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою                                     | однакові  | 3   |
| 31 | Час початку досягання ягід  | середній  | 5   |
| 32 | Гроно: за розміром (без ніжки)  | середнє   | 5   |
| 33 | Гроно: за щільністю   | середнє   | 5   |
| 34 | Гроно: довжина ніжки первинного грона   | коротка   | 3   |
| 35 | Ягода: за розміром  | середня   | 5   |
| 36 | Ягода: форма  | куляста   | 2   |
| 37 | Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)   | блакитно-чорний   | 9   |
| 38 | Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)                                       | порівняно легко   | 2   |
| 39 | Ягода: товщина шкірки   | середня   | 2   |
| 40 | Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті  | відсутнє або дуже слабке  | 1   |
| 41 | Ягода: твердість м'якоті  | м'яка або твердувата  | 1   |
| 42 | Ягода: особливий аромат   | відсутній   | 1   |
| 43 | Ягода: формування насіння   | повноцінне  | 3   |
| 44 | Здерев'янілий пагін: основне забарвлення  | оранжево-коричнє  | 2   |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність 147 ц/га. Середній урожай з куша 3,8 кг. Середня маса 100 ягід 255 г. Рівень підмерзання бруньок та лози 4 - 6 балів, стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю – 7 балів, мільдою та оїдіумом 5, до пошкодження листокруткою 5

балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середня.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**  
Степ