

Вид: Капуста броколі Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Заявка №: 12028009 **Назва сорту** Некос

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140320

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість стебел	одне	1
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Листок: за положенням (на початку формування головки)	горизонтальний	5
4	Листок: за довжиною	довгий	7
5	Листок: за шириною	широкий	7
6	Листок: кількість часток	мало	3
7	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
14	Черешок: за довжиною	довгий	7
15	Головка: довжина галузок від основи (не враховуючи стебло)	середні	5
16	Головка: за розміром	маленька	3
17	Головка: форма у поздовжньому розрізі	кругла	1
18	Головка: забарвлення	блакитно-зелене	4
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
20	Головка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: структура тканини	помірна	5
24	Головка: за щільністю	помірна	5
25	Головка: покривний листок	відсутній	1
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3
28	Квітка: забарвлення	біле	1
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначається	0
30	Час досягання (50% рослин)	середній	5
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	середній	5
32	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 30 т./га. Тривалість періоду до досягання 75 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт