

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 09031018 Назва сорту Кібіц

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.04.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130223

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	круглий	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		180,1	217,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		6,7	-20,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		5	-8
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		-54,7	-57,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		-23	-21
Вміст крохмалю, %		18,3	18,3

Збір крохмалю, ц/га	26,6	38
Вміст сухої речовини, %	25,7	25,3
Вегетаційний період, днів	93	81
Маса бульб, г	75,4	85
Смакові якості, б	6	8,5
Товарність бульб, %	90	93
Лежкість, бал	9	9
Стійкість до пошкодження нематодою	стійкий	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	стійкий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп