

Вид: Капуста червоноголова Brassica oleracea L. var. rubra DC.

Заявка №: 11030002 Назва сорту Ранчеро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140144

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	середній	5
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	фіолетовий	5
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	наявна	9
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	фіолетове	5
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	ознака не визначається	0
28	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	помірне	5
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f.sp. Conglutinans	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 75 т./га. Період від повних сходів до початку досягання 92 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся