

Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L.

Заявка №: 11087001 Назва сорту Галактика

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.03.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0
5	Кущові сорти. Рослина: тип росту	сланкий	2
6	Кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5
7	Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0
8	Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5
11	Верхівковий листочок: за розміром	великий	7
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
14	Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1
15	Квітка: розмір приквітка	середній	5
16	Квітка: колір паруса	рожевий	3
17	Квітка: колір крил	рожевий	3
18	Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка)	середній	5
19	Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	середній	5
21	Біб: за товщиною	помірний	5
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основний колір	зелений	2
25	Біб: інтенсивність основного кольору	помірний	5
26	Біб: вторинний колір	наявний	9
27	Біб: колір вторинного забарвлення	фіолетовий	3
28	Біб: щільність плям вторинного кольору	помірної щільності	5
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням гачка)	тупа	3
33	Біб: довжина гачка	довгий	7
34	Біб: вигин гачка	відсутній або дуже слабкий	1
35	Біб: характер поверхні	зморшкувата	3
37	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5
38	Насінина: форма поздовжнього розтину	нирковидна	4
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2
41	Насінина: поперечний переріз за шириною	середній	5
42	Насінина: за довжиною	середня	5
43	Насінина: кількість кольорів	два	2
44	Насінина: основний колір (найбільша зона)	фіолетовий	8
45	Насінина: вторинний колір	коричневий	4
46	Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору	пістрявий	3
47	Насінина: жилкування	слабке	3
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	дуже ранній	1
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Паса 6	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Паса Кappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola): Паса 6	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), ізолят 422	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%) 24,5 т./га. Тривалість вегетації рослин 88 діб. Стійкість до вилягання 9 балів. Висота прикріплення нижнього бобу 16 см. Вміст сирого протеїну 21%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп