

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115039 Назва сорту: Буллз Заявник (код): 2292 Власник сорту (код): 2292

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180934

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 | |
| 2 | Рослина: тип розвитку | індетермінантний | 2 | |
| 3 | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють) | ознака не визначається | 0 | |
| 4 | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 5 | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям | середнє | 5 | |
| 6 | Листок: положення (у середній третині рослини) | напівпоникле | 7 | |
| 7 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 8 | Листок: за шириною | середній | 5 | |
| 9 | Листок: за розсіченістю | перистий | 1 | |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка) | середній | 5 | |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 | |
| 12 | Листок: глянуватість (як для б) | слабка | 3 | |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для б) | помірна | 5 | |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для б) | малий | 3 | |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі | піднесене | 3 | |
| 16 | Суцвіття: за типом | переважно не галузисте | 1 | |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) | відсутня | 1 | |
| 18 | Квітка: опушення приймочки маточки | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 19 | Квітка: забарвлення | жовте | 1 | |
| 20 | Квітоніжка: відокремлюючий шар | наявний | 9 | |
| 21 | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітоніжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | коротка | 3 | |
| 22 | Плід: розмір | середній | 5 | |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра | середнє | 5 | |
| 24 | Плід: форма повздовжнього розрізу | округла | 3 | |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу | кругляста | 2 | |
| 27 | Плід: заглиблення біля плодоніжки | відсутнє або дуже мілке | 1 | |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки | дуже малий | 1 | |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця | дуже малий | 1 | |
| 30 | Плід: форма кінця плоду | плеската | 3 | |
| 31 | Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі | середній | 5 | |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною | середній | 5 | |
| 33 | Плід: кількість насінневих камер | три-чотири | 3 | |
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням) | відсутнє | 1 | |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням) | ознака не визначається | 0 | |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням) | дуже слабка | 1 | |
| 38 | Плід: забарвлення (за досягання) | червоне | 5 | |
| 39 | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання) | червоне | 5 | |
| 40 | Плід: за твердістю | помірний | 5 | |
| 41 | Плід: термін лежкості | тривалий | 7 | |
| 42 | Час цвітіння | ранній | 3 | |
| 43 | Час досягання | ранній | 3 | |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання) | середній | 5 | |
| 45 | Наявність сріблястості | несприятливий | 1 | |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i> | відсутня | 1 | |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i> | наявна | 9 | |
| 48,1 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> | наявна | 9 | |
| 48,2 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1 | ознака не визначалась | 0 | |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i> | наявна | 9 | |
| 50,1 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>) | відсутня | 1 | |
| 50,2 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А | ознака не визначалась | 0 | |
| 50,3 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В | ознака не визначалась | 0 | |
| 50,4 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С | ознака не визначалась | 0 | |
| 50,5 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D | ознака не визначалась | 0 | |
| 50,6 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E | ознака не визначалась | 0 | |
| 51,1 | Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i> | відсутня | 1 | |
| 51,2 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1 | ознака не визначалась | 0 | |
| 51,3 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2 | ознака не визначалась | 0 | |
| 51,4 | Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2 | ознака не визначалась | 0 | |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i> | наявна | 9 | |
| 53 | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> | відсутня | 1 | |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp. | відсутня | 1 | |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> | наявна | 9 | |
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i> | відсутня | 1 | |
| 57 | Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i> | наявна | 9 | |
| 58 | Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i> | наявна | 9 | |

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|-------------|-----|----------|
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i> | наявна | 9 | |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i> | відсутня | 1 | |
| 61 | Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i> | відсутня | 1 | |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою | дуже висока | 9 | |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед досяганням) | відсутні | 1 | |
| 64 | Плід: глянуватість шкірки | помірна | 2 | |
| 65 | Плід: епідерміс | жовтий | 2 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 39. Вміст каротину, мг% – 0,6. Вміст сухої речовини в плоді, % – 6,8. Вміст вітаміну С, мг% – 13,3. Вміст загального цукру, % – 3,9. Загальна кислотність, % – 0,42. Маса товарного плоду, г – 140. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 90. Тривалість періоду плодоношення, діб – 86. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.