

Вид: Кукурудза звичайна  
Zea mays L

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Проксі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110334

| №  | Ознака  | Проявлення                    | Код |
|----|---|-------------------------------|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | сильне                        | 7   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки   | округла                       | 3   |
| 3  | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                                | середній (26-50)              | 5   |
| 4  | Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)                              | ледь похиле                   | 3   |
| 5  | Стебло: зигзагоподібність   | відсутня або дуже слабка      | 1   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | помірне                       | 5   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)                                  | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)                 | сильне                        | 7   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | помірне                       | 5   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)     | помірне                       | 5   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)  | середньої щільності           | 5   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)                             | середній (26-50)              | 5   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті   | пряме                         | 1   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.   | мала від 5 до 15              | 3   |
| 15 | Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)   | ранній                        | 3   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку"  | наявне                        | 9   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"  | помірна                       | 5   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)   | відсутнє або дуже слабке      | 1   |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см                              | середня від 31 до 40          | 5   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)                | коротка                       | 3   |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною   | середні                       | 5   |
| 22 | Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                               | ознака не визначається        | 0   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см           | довга від 151 до 200          | 7   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини                           | дуже мале                     | 1   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см                              | середня від 8.1 до 10.0       | 5   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см  | довга від 20.1 до 40          | 7   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см   | середній (19-22)              | 5   |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см  | великий від 4,1 до 5,0        | 7   |
| 29 | Качан: форма  | конусно-циліндрична           | 2   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.  | мала від 9 до 14              | 3   |

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 31 Качан: тип зернини (в центральній третині качана)            | проміжний       | 3 |
| 32 Качан: колір верхівки зернини                                | жовто-оранжевий | 4 |
| 33 Качан: колір низу зернини                                    | оранжевий       | 5 |
| 34 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                 | наявне          | 9 |
| 35 Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | сильна          | 7 |

| №  | Ознака                                  | Проміжки          | №  |
|----|---|-------------------|----|
| 1  | Глибина антоціанового забарвлення лусок | глибока           | 1  |
| 2  | Глибина лусок                           | округла           | 2  |
| 3  | Глибина лусок (20-30)                   | кавадні (20-30)   | 3  |
| 4  | Глибина лусок (30-40)                   | кавадні (30-40)   | 4  |
| 5  | Глибина лусок (40-50)                   | кавадні (40-50)   | 5  |
| 6  | Глибина лусок (50-60)                   | кавадні (50-60)   | 6  |
| 7  | Глибина лусок (60-70)                   | кавадні (60-70)   | 7  |
| 8  | Глибина лусок (70-80)                   | кавадні (70-80)   | 8  |
| 9  | Глибина лусок (80-90)                   | кавадні (80-90)   | 9  |
| 10 | Глибина лусок (90-100)                  | кавадні (90-100)  | 10 |
| 11 | Глибина лусок (100-110)                 | кавадні (100-110) | 11 |
| 12 | Глибина лусок (110-120)                 | кавадні (110-120) | 12 |
| 13 | Глибина лусок (120-130)                 | кавадні (120-130) | 13 |
| 14 | Глибина лусок (130-140)                 | кавадні (130-140) | 14 |
| 15 | Глибина лусок (140-150)                 | кавадні (140-150) | 15 |
| 16 | Глибина лусок (150-160)                 | кавадні (150-160) | 16 |
| 17 | Глибина лусок (160-170)                 | кавадні (160-170) | 17 |
| 18 | Глибина лусок (170-180)                 | кавадні (170-180) | 18 |
| 19 | Глибина лусок (180-190)                 | кавадні (180-190) | 19 |
| 20 | Глибина лусок (190-200)                 | кавадні (190-200) | 20 |
| 21 | Глибина лусок (200-210)                 | кавадні (200-210) | 21 |
| 22 | Глибина лусок (210-220)                 | кавадні (210-220) | 22 |
| 23 | Глибина лусок (220-230)                 | кавадні (220-230) | 23 |
| 24 | Глибина лусок (230-240)                 | кавадні (230-240) | 24 |
| 25 | Глибина лусок (240-250)                 | кавадні (240-250) | 25 |
| 26 | Глибина лусок (250-260)                 | кавадні (250-260) | 26 |
| 27 | Глибина лусок (260-270)                 | кавадні (260-270) | 27 |
| 28 | Глибина лусок (270-280)                 | кавадні (270-280) | 28 |
| 29 | Глибина лусок (280-290)                 | кавадні (280-290) | 29 |
| 30 | Глибина лусок (290-300)                 | кавадні (290-300) | 30 |