

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08396001

Вид: Нектарін

Prunus persica (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) Schneid.

Назва сорту: Кіпарг

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08398

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------|-----|
| 1 | Дерево: за висотою | середнє | 5 |
| 2 | Дерево: сила росту | середньої сили | 5 |
| 3 | Дерево: габітус | напівпрямий | 3 |
| 4 | Квітконосний пагін: за товщиною (без плодкових гілочок) | середній | 5 |
| 5 | Квітконосний пагін: довжина міжвузлів (без плодкових гілочок) | середня | 5 |
| 6 | Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення верхівки (без плодкових гілочок, визначається з тінювого боку) | відсутнє | 1 |
| 7 | Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки (як для 6) | слабка | 3 |
| 8 | Квітконосний пагін: щільність розміщення генеративних бруньок (як для 4) | щільно | 7 |
| 9 | Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок (як для 4) | по дві і більше | 2 |
| 10 | Квітка: тип | не яскрава | 1 |
| 11 | Чашечка: забарвлення внутрішнього боку (визначається на відкритій квітці до обпадання пелюсток) | зеленувато-жовте | 1 |
| 12 | Віночок: переважаючий колір (внутрішнього боку) | світло-рожевий | 3 |
| 13 | Пелюстка: форма | округла | 3 |
| 14 | Пелюстка: розмір | середня | 5 |
| 15 | Пелюстки: кількість | п'ять | 1 |
| 16 | Тичинки: положення відносно пелюсток | на одному рівні | 2 |
| 17 | Приймочка: положення відносно пиляків | на одному рівні | 2 |
| 18 | Пиляки: наявність пилку | наявний | 9 |
| 19 | Зав'язь: опушення | наявне | 9 |
| 20 | Молодий пагін: прилистки за довжиною (визначається на листках, що повністю розгорнулись) | довгі | 7 |
| 21 | Листкова пластинка: за довжиною | довга | 7 |
| 22 | Листкова пластинка: за шириною | середня | 5 |
| 23 | Листкова пластинка: відношення довжини до ширини | середнє | 5 |
| 24 | Листкова пластинка: форма у поперечному перерізі | увігнута | 1 |
| 25 | Листкова пластинка: загин верхівки | наявний | 9 |
| 26 | Листкова пластинка: кут біля основи | гострий | 1 |
| 27 | Листкова пластинка: кут біля верхівки | великий | 7 |
| 28 | Листкова пластинка: колір | зелений | 2 |
| 29 | Черешок листка: за довжиною | середній | 5 |
| 30 | Черешок листка: наявність нектарників | наявні | 9 |
| 31 | Черешок листка: форма нектарників | округлі | 1 |
| 32 | Черешок листка: переважаюча кількість нектарників | два | 1 |
| 33 | Плід: розмір | великий | 7 |
| 34 | Плід: форма (з вентрального боку) (з боку шва) | округла | 3 |

Заявка №: 08396001

Вид: Нектарін

Prunus persica (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) Schneid.

Назва сорту: Кіпарг

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.09.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08398

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 35 | Плід: форма маточкового кінця (вигляд з боку ямки плодоніжки) | слабко виступаюча | 2 |
| 36 | Плід: симетрія (вигляд з маточкового кінця) | симетричний | 2 |
| 37 | Плід: помітність шва | слабка | 3 |
| 38 | Плід: глибина ямки плодоніжки | середня | 5 |
| 39 | Плід: ширина ямки плодоніжки | середня | 5 |
| 40 | Плід: основний колір | кремово-жовтий | 8 |
| 41 | Плід: наявність відтінку (поверхневого кольору) | наявний | 9 |
| 42 | Плід: поверхнєве забарвлення | червоне | 5 |
| 43 | Плід: рисунок поверхневого забарвлення | густонасичений | 1 |
| 44 | Плід: покриття поверхневим забарвленням | велике | 7 |
| 45 | Плід: опушення | наявне | 9 |
| 46 | Плід: густина опушення | густе | 7 |
| 47 | Плід: товщина шкірки | середня | 5 |
| 48 | Плід: зростання шкірки з м'якушем | слабке | 3 |
| 49 | Плід: твердість м'якуша | м'яка | 3 |
| 50 | Плід: основний колір м'якуша | кремово-білий | 3 |
| 51 | Плід: антоціанове забарвлення під шкіркою | слабке | 3 |
| 52 | Плід: антоціанове забарвлення м'якуша | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 53 | Плід: антоціанове забарвлення навколо кісточки | слабке | 2 |
| 54 | Плід: структура м'якуша | волокниста | 2 |
| 55 | Плід: солодкий смак | сильний | 7 |
| 56 | Плід: кислий смак | помірний | 5 |
| 57 | Кісточка: за розміром порівняно з плодом | середня | 5 |
| 58 | Кісточка: форма (вигляд збоку) | еліптична | 3 |
| 59 | Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення | помірна | 5 |
| 60 | Кісточка: ямкуватість поверхні | ямки та борозенки | 4 |
| 61 | Кісточка: здатність до розтріскування (розколювання) (визначається у період максимуму врожаю) | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 62 | Кісточка: зростання з м'якушем | відсутнє | 1 |
| 63 | Кісточка: ступінь зростання з м'якушем | слабкий | 3 |
| 64 | Час листопаду (коли листки відриваються від бруньок) | пізній | 7 |
| 65 | Час початку цвітіння | середній | 5 |
| 66 | Тривалість цвітіння | середньої тривалості | 5 |
| 67 | Час споживчої стиглості | середній | 5 |
| 68 | Здатність врожаю до передчасного обпадання | помірна | 5 |