

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 04029007

Вид: Капуста цвітна

Brassica oleraceae L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Назва сорту: Немо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 **Патент №:** 07221

Дата пріоритету: 20.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-------------------|-----|
| 1 | Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: за висотою, см (за збирання) | низька (50-60) | 3 |
| 3 | Зонішне стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка) | коротке | 3 |
| 4 | Листок: положення | висхідний | 2 |
| 5 | Листок: за довжиною, см | короткий (30-50) | 3 |
| 6 | Листок: за шириною | широкий | 7 |
| 7 | Листок: за формою | еліптичний | 2 |
| 8 | Листок: дольчастість | відсутня | 1 |
| 9 | Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | синьо-зелений | 3 |
| 10 | Листок: за інтенсивністю забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | світлий | 3 |
| 11 | Листок: поперечний переріз середньої жилки у нижній третині | округлий | 3 |
| 12 | Листок: закручування верхівки | помірне | 5 |
| 13 | Листок: форма поперечного перетину | плеската | 2 |
| 14 | Листок: пухирчастість | помірна | 5 |
| 15 | Листок: розподіл пухирчастості | лише біля кінчика | 1 |
| 16 | Листок: змошкватість біля середньої жилки | помірна | 5 |
| 17 | Листок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 18 | Головка: покриття внутрішніми листками | частково вкрита | 2 |
| 19 | Головка: за висотою | коротка | 3 |
| 20 | Головка: за діаметром | середня | 5 |
| 21 | Головка: форма поздовжнього перерізу | еліптична | 3 |
| 22 | Головка: утворення склепіння (виключаючи сорти з трикутною головою) | помірне | 5 |
| 23 | Головка: забарвлення | жовте | 2 |
| 24 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 |
| 25 | Головка: текстура | помірна | 5 |
| 26 | Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості | відсутнє | 1 |
| 27 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 |
| 28 | Час досягання в рекомендований період вирощування | середній | 5 |