

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 03025002

Вид: Диня

Cucumis melo L.

Назва сорту: Дідона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07247

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилія (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (фаза першого справжнього листка), см	середні (1-2)	5
3	Паросток: інтенсивність зеленого кольору (фаза першого справжнього листка)	помірна	5
4	Рослина: кількість вузлів на основному стеблі (включно до першого вусика)	середньо	5
5	Листкова пластинка: за розміром, см	мала (<14)	3
6	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
7	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3
8	Листкова пластинка: довжина кінцевої лопаті (центральної)	коротка	3
9	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
10	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
11	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
12	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5
13	Черешок: за довжиною, см	короткий (<12)	3
14	Квітки: за статтю	однодомні	1
15	Плід: основний колір шкірки перед досяганням	зелений	3
16	Плід: інтенсивність кольору перед досяганням	помірна	5
17	Плід: за довжиною, см	середній (15-22)	5
18	Плід: за діаметром	середній	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	мале (1:1,5)	3
20	Плід: місце найбільшої ширини	у центрі	2
21	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	2
22	Плід: основний колір шкірки в період досягання	зелений	2
23	Плід: інтенсивність основного кольору шкірки в період досягання	сильна	7
24	Плід: додаткове забарвлення шкірки (за винятком основного)	відсутнє	1
25	Плід: поширення додаткового забарвлення по шкірці (за винятком основного)	ознака не визначається	0
26	Плід: щільність розміщення цяток	ознака не визначається	0
27	Плід: щільність розміщення плям	ознака не визначається	0
28	Плід: довжина плодоніжки, см	середня (3-7)	5
29	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	середня (0,5-0,7)	5
30	Плід: видривання (відпадання) плодоніжки	наявне	9
31	Плід: легкість відривання плодоніжки	важке	7
32	Плід: форма основи	заокруглена	2
33	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
34	Плід: розмір рубця маточки, см	середній (5-10)	5
35	Плід: смуги	відсутні	1

Заявка №: 03025002

Вид: Дня

Cucumis melo L.

Назва сорту: Дідона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07247

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Плід: максимальна ширина між смугами	ознака не визначається	0
37	Плід: ширина смуг	ознака не визначається	0
38	Плід: глибина смуг	ознака не визначається	0
39	Плід: зморшкуватість поверхні	ввідсутня або дуже слабка	1
40	Плід: коркове утворення	наявне	9
41	Плід: товщина коркового шару	тонкий	3
42	Плід: візерунок коркового утворення	сітчастий	3
43	Плід: щільність візерунка коркового утворення	густий	7
44	Плід: колір смуг	ознака не визначається	0
45	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0
46	Плід: максимальна ширина м'якуша в поперечному розрізі, см	товстий (>3)	7
47	Плід: максимальна товщина зовнішнього м'якуша в поперечному розрізі, см	середній (0,5-1)	5
48	Плід: основний колір м'якуша	кремовий	1
49	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якуша	помірна	5
50	Плід: колір м'якуша зовнішнього шару	кремовий	1
51	Насінина: за розміром, см	середня (0,9-1,2)	5
52	Насінина: форма кінчика	поступово загострена	2
53	Насінина: форма поперечного розрізу	еліптична	2
54	Насінина: за кольором	слонової кістки	1
55	Початок цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією жіночою квіткою)	середній	5
56	Початок досягання (50 % рослин щонайменше з одним стиглим плодом)	середній	5
57	Стійкість до раси 0 <i>Fusarium oxysporum</i> f. Sp. Melonis	наявна	9
58	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
59	Стійкість до раси 2 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
60	Стійкість до рас 1 - 2 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
61	Стійкість до колоній <i>Aphis gossypii</i>	ознака не визначена	0
62	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	ознака не визначена	0
63	Стійкість до штаму GVA кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0
64	Стійкість до штаму E2 кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0
65	Стійкість до штаму Es кільчастого вірусу папайї	ознака не визначена	0