

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

**Заявка №:** 05025005

**Вид:** Диня

*Cucumis melo* L.

**Назва сорту:** Борівчанка

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності** 05.04.2007 **Патент №:** 07517

**Дата пріоритету:** 27.09.2005

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.01.2007

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 07215

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилія (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (фаза першого справжнього листка), см	середні (1-2)	5
3	Паросток: інтенсивність зеленого кольору (фаза першого справжнього листка)	помірна	5
4	Рослина: кількість вузлів на основному стеблі (включно до першого вусика)	середньо	5
5	Листкова пластинка: за розміром, см	середня (14-18)	5
6	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
7	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5
8	Листкова пластинка: довжина кінцевої лопаті (центральної)	середня	5
9	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
10	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
11	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
12	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	горизонтальне	7
13	Черешок: за довжиною, см	середній (12-20)	5
14	Квітки: за статтю	двodomні	2
15	Плід: основний колір шкірки перед досяганням	зелений	3
16	Плід: інтенсивність кольору перед досяганням	слабка	3
17	Плід: за довжиною, см	довгий (22-30)	7
18	Плід: за діаметром	середній	5
19	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє (1:2)	5
20	Плід: місце найбільшої ширини	у центрі	2
21	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	2
22	Плід: основний колір шкірки в період досягання	зелений	2
23	Плід: інтенсивність основного кольору шкірки в період досягання	помірна	5
24	Плід: додаткове забарвлення шкірки ( за винятком основного)	відсутнє	1
25	Плід: поширення додаткового забарвлення по шкірці (за винятком основного)	рисками (цятками)	1
26	Плід: щільність розміщення цяток	рідко	3
27	Плід: щільність розміщення плям	рідко	3
28	Плід: довжина плодоніжки, см	середня (3-7)	5
29	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	середня (0,5-0,7)	5
30	Плід: видривання (відпадання) плодоніжки	відсутнє	1
31	Плід: легкість відривання плодоніжки	помірне	5
32	Плід: форма основи	заокруглена	2
33	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
34	Плід: розмір рубця маточки, см	середній (5-10)	5
35	Плід: смуги	наявні	9

Заявка №: 05025005

Вид: Дня

Cucumis melo L.

Назва сорту: Борівчанка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 05.04.2007 Патент №: 07517

Дата пріоритету: 27.09.2005

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2007

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07215

№	Ознака	Проявлення	Код
36	Плід: максимальна ширина між смугами	мала	3
37	Плід: ширина смуг	мала	3
38	Плід: глибина смуг	неглибокі	3
39	Плід: зморшкватість поверхні	слабка	3
40	Плід: коркове утворення	відсутнє	1
41	Плід: товщина коркового шару	середній	5
42	Плід: візерунок коркового утворення	сітчастий	3
43	Плід: щільність візерунка коркового утворення	середній	5
44	Плід: колір смуг	білий	1
45	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірна	5
46	Плід: максимальна ширина м'якуша в поперечному розрізі, см	товстий (>3)	7
47	Плід: максимальна товщина зовнішнього м'якуша в поперечному розрізі, см	середній (0,5-1)	5
48	Плід: основний колір м'якуша	зелений	2
49	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якуша	помірна	5
50	Плід: колір м'якуша зовнішнього шару	зелений	2
51	Насінина: за розміром, см	середня ( 0,9-1,2)	5
52	Насінина: форма кінчика	поступово загострена	2
53	Насінина: форма поперечного розрізу	еліптична	2
54	Насінина: за кольором	кремово-жовта	2
55	Початок цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією жіночою квіткою)	середній	5
56	Початок досягання (50 % рослин щонайменше з одним стиглим плодом)	середній	5
57	Стійкість до раси 0 <i>Fusarium oxysporum</i> f. Sp. Melonis	наявна	9
58	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
59	Стійкість до раси 2 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
60	Стійкість до рас 1 - 2 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. Melonis	наявна	9
61	Стійкість до колоній <i>Aphis gossypii</i>	наявна	9
62	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	наявна	9
63	Стійкість до штаму GVA кільчастого вірусу папайї	наявна	9
64	Стійкість до штаму E2 кільчастого вірусу папайї	наявна	9
65	Стійкість до штаму Es кільчастого вірусу папайї	наявна	9