

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 06032002

Вид: Кукурудза цукрова

Zea mays L. ssp. *saccharata* Sturt.

Назва сорту: Санданс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 **Патент №:** 08476

Дата пріоритету: 19.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | середнє | 5 |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 |
| 3 | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном) | середній від 26 до 50 | 5 |
| 4 | Листок: положення листкової пластинки і стеблом (листок над верхнім качаном) | ледь похиле | 3 |
| 5 | Стебло: степінь зигзагоподібності | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | слабке | 3 |
| 7 | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, до 50% рослин) | ранній | 3 |
| 8 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (на середній третині головної осі) | середнє | 5 |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | середнє | 5 |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно утворених пиляках) | середнє | 5 |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі) | середнє | 5 |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (на нижній третині волоті) | середній від 26 до 50 | 5 |
| 13 | Волоть: положення бічних гілок (на нижній третині волоті) | пряме | 1 |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт | невелика від 6 до 15 | 3 |
| 15 | Качан: час появи шовку (50% рослин) | ранній | 3 |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | наявне | 9 |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення шовку | середня | 5 |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 19 | Волоть: довжина головної осі (від найнижчої бічної гілочки до верхівки, см) | середня від 31 до 40 | 5 |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | коротка | 3 |
| 21 | Волоть: довжина бічних гілочок | короткі | 3 |
| 22 | Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Лише для гібридів і сортів вільнозапилюваних: Рослина: довжина (врахов. волоть), см | середня | 5 |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослин | дуже мале до 0,4 | 1 |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (листок верхнього качана), см | вузька до 8 | 3 |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см | середня від 10,1 до 20 | 5 |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см | коротка 9-10 | 3 |
| 28 | Качан: діаметр (посередині), см | великий від 4,1 до 5 | 7 |
| 29 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 |

Заявка №: 06032002

Вид: Кукурудза цукрова

Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Назва сорту: Санданс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 01.07.2008 Патент №: 08476

Дата пріоритету: 19.01.2006

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт. | мала 8-14 | 3 |
| 31 | Качан: тип зерна (в центральній третині початку) | цукрова кукурудза | 6 |
| 32 | Качан: колір верхньої частини зерна | оранжевий | 5 |
| 33 | Качан: колір нижньої частини зерна | оранжевий | 5 |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | відсутнє | 1 |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | ознака не визначається | 0 |