

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 16088021 Назва сорту:** ДОНАТА **Заявник (код):** 1046 **Власник сорту (код):** 1046**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.02.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190061****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3	
23	Листочек: хвильистість краю	помірна	5	
24	Листочек: загиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	відсутнє	1	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	203,6	164,6	
Довірчий інтервал, ц/га (+)	14,8	6,0	
Урожайність, ц/га	275,2	216,1	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	71,6	51,5	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	35	31	
Вміст крохмалю, %	16,7	15,8	
Збір крохмалю, ц/га	46,0	34,1	
Вміст сухої речовини, %	24,3	23,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	111	104	
Середня маса товарної бульби, г	114,3	91,3	
Товарність бульб, %	71,7	77,3	
Лежкість, бал	5	9	
Дегустаційна оцінка, бал	9	9	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	9	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	пкр	скр	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.