

Вид: Житняк гребінчастий *Agropyron pectinatum* (M.Bieb.) P.Beauv.

Заявка № 15532001 Назва сорту: Глобинський **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 181011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
3	Листок: восковий наліт	відсутній	1	
4	Листок: за шириною	середній	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Рослина: габітус (1-го року життя)	прямий	1	
7	Рослина: схильність до колосіння (1-го року життя)	сильна	7	
8	Рослина: за природною висотою основної маси листя	середня	5	
9	Рослина: тип куща (2-го року життя)	прямий	1	
10	Рослина: кущіння	слабке	3	
11	Рослина: найдовше стебло за довжиною	середнє	5	
12	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
13	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3	
14	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
15	Колос: за довжиною	середній	5	
16	Колос: за шириною	вузький	3	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: форма	ланцетно-овальна	3	
19	Колос: опушення	відсутнє	1	
20	Рослина: час колосіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,58. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 9,5. Вміст білка у сухій речовині, % – 14,5. Вміст клітковини у сухій речовині, % – 25,6. Тривалість періоду від появи сходів (відновлення весняної вегетації) до укїсної стиглості, дїб – 60. Тривалість періоду від появи сходів (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості насіння, дїб – 117. Висота рослин, см – 93. Число укосів, шт. – 3. Продуктивне довголіття, років – 9. Маса 1000 насінин, г – 21. Стїйкїсть до вилягання, бал (1–9) – 8. Стїйкїсть до обсипання, бал (1–9) – 9. Зимостїйкїсть, бал (1–9) – 9. Посухостїйкїсть, бал (1–9) – 9. Стїйкїсть проти збудникїв хвороб, бал (1–9): їржа листкова – 8; сажка летюча – 9. Стїйкїсть проти збудникїв хвороб, бал (1–9): борошнїста роса, септорїоз – 9.

Географїчні та зоновї рекомендації використання сорту: СЛ.