

**Вид:** Люпин жовтий *Lupinus luteus* L.

**Заявка № 15402001 Назва сорту:** Рябчик **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.02.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190384**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	відсутня	1	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3	
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3	
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3	
9	Квітка: забарвлення крил	темно-жовте	7	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	низька	3	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	середня	5	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час досягання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментация	наявна	9	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	коричневе	2	
19	Насінина: розподіл орнаментации	суцільна за винятком брови	2	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	ознака не визначається	0	
21	Насіння: маса 100 шт.	середня	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		42,1	48,8
Довірчий інтервал, ц/га (±)		6,6	7,4
Урожайність, ц/га		40,5	55
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га		-1,6	6,2
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %		-4	13
Тривалість періоду вегетації, днів		67	71
Урожайність насіння, ц/га		17,8	11,9
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти антракнозу, бал		7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал		7	7
Стійкість проти сірої гнилі, бал		8	8
Залистяність, %		59,3	69,0
Вміст сирого протеїну, %		18,8	17,6
Напрямок використання		корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** П.