

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench

Заявка № 15241002 Назва сорту: Гулівер **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190633

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: швидкість початкового росту	велика	7	
4	Рослина: кількість листків	середня	5	
5	Рослина: час появи волоті	середній	5	
6	Рослина: за висотою	висока	7	
7	Листок: за довжиною	короткий	3	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	біле	1	
10	Суцвіття: форма	обернено-конусоподібна	4	
11	Суцвіття: положення у просторі	пряме	1	
12	Суцвіття: за щільністю	середнє	5	
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	середнє	5	
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	широке	7	
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9	
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	слабке	3	
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
18	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
19	Волоть: зазерненість	наявна	9	
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0	
21	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	111,9	74,2	-
Довірчий інтервал (ц/га), ±	7,6	1,4	-
Урожайність, ц/га	108,6	130,8	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-3,3	56,6	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-2,9	76,2	-
Період від повних сходів до початку воскової стиглості, діб	96	110	-
Висота рослин, см	209	264	-
Стійкість до вилягання, бал	8	8	-
Стійкість до посухи, бал	8	9	-
Стійкість до бактеріозу, бал	8	9	-
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9	8	-
Стійкість проти стеблового метелика, бал	9	8	-
Вміст сирової клітковини, %	28,0	29,0	-
Вміст сирого протеїну, %	10,6	8,7	-
Напрямок використання: кормовий			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.