

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 16096020 Назва сорту:** ЕПІКУР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190049**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|------|---|--------------------------|-----|----------|
| 1,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою  | дуже висока              | 9   |          |
| 1,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою                                     | ознака не визначається   | 0   |          |
| 1,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою   | ознака не визначається   | 0   |          |
| 2,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | середній                 | 5   |          |
| 2,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                | ознака не визначається   | 0   |          |
| 2,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                    | ознака не визначається   | 0   |          |
| 3    | Рослина: зовнішнє стебло за довжиною  | коротке                  | 3   |          |
| 4    | Рослина: положення зовнішніх листків  | напівпряме               | 3   |          |
| 5,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір                                   | великий                  | 7   |          |
| 5,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір                                | ознака не визначається   | 0   |          |
| 5,3  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір                                    | ознака не визначається   | 0   |          |
| 6    | Зовнішній листок: форма пластинки   | округла                  | 3   |          |
| 7    | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки  | увігнутий                | 1   |          |
| 8,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості   | помірний                 | 2   |          |
| 8,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості                     | ознака не визначається   | 0   |          |
| 9,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців         | середній                 | 5   |          |
| 9,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців                           | ознака не визначається   | 0   |          |
| 10   | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість                              | ознака не визначається   | 0   |          |
| 11   | Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)   | сіро-зелене              | 3   |          |
| 12   | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення   | помірна                  | 5   |          |
| 13   | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість                        | ознака не визначається   | 0   |          |
| 14   | Зовнішній листок: восковий наліт  | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 15   | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю  | слабкий                  | 3   |          |
| 16   | Зовнішній листок: вигин краю  | наявний                  | 9   |          |
| 17   | Головка: форма поздовжнього розрізу   | округла                  | 3   |          |
| 18   | Головка: форма основи у поздовжньому розрізі  | округла                  | 1   |          |
| 19   | Головка: за довжиною  | середня                  | 5   |          |
| 20   | Головка: діаметр  | середній                 | 5   |          |
| 21   | Головка: розміщення найбільшого діаметра  | посередині               | 2   |          |
| 22   | Головка: ступінь покриття   | покритий                 | 3   |          |
| 23   | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка                    | ознака не визначається   | 0   |          |
| 24   | Головка: вигин краю покривного листка   | наявний                  | 9   |          |
| 25   | Головка: забарвлення покривного листка  | сіро-зелене              | 3   |          |
| 26   | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка  | помірна                  | 5   |          |
| 27   | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 28   | Головка: внутрішнє забарвлення  | білувате                 | 1   |          |
| 29   | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення              | ознака не визначається   | 0   |          |
| 30   | Головка: за щільністю   | дуже щільна              | 9   |          |
| 31   | Головка: внутрішня структура  | тонка                    | 3   |          |
| 32   | Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки                                   | довга                    | 7   |          |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості  | пізній                   | 7   |          |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості                                     | ознака не визначається   | 0   |          |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості   | ознака не визначається   | 0   |          |
| 34   | Час розтріскування головки після досягання  | пізній                   | 7   |          |
| 35   | Чоловіча стерильність   | наявна                   | 9   |          |
| 36   | Стієкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>                        | ознака не визначалась    | 0   |          |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 120. Період від сівби до початку досягання, діб – 125. Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 30. Вміст загального цукру, % – 3. Вміст сухої речовини, % – 12. Стієкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизивий – 8, бактеріоз судинний – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**