

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 17101001 Назва сорту: АРДЕНТ **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190055

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	сильна	7	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	груба	7	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 78. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 10–15. Вміст білка, % – 1,9. Вміст загального цукру, % – 2. Вміст сухої речовини, % – 7,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизивий – 3; бактеріоз судинний – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.