

Патент №: 0747 Заявка №: 04012007

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту Мальз

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Дата пріоритету: 08.10.2004

Власник(и): Планта Селект - товариство з обмеженою відповідальністю  
Осева Ексімпо Прага с.р.о.

| №  | Ознака   | Проявлення                           | Код |
|----|--|--------------------------------------|-----|
| 1  | Рослина: форма куша (габітус)  | напіврозлогий                        | 5   |
| 2  | Нижні листки: опушення піхви   | відсутнє                             | 1   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                                  | наявне                               | 9   |
| 4  | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок                  | дуже сильна                          | 9   |
| 5  | Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком                              | середньо                             | 5   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві  | помірний                             | 5   |
| 7  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                            | середнє                              | 5   |
| 8  | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків                               | наявне                               | 9   |
| 9  | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків                           | сильне                               | 7   |
| 10 | Колос: восковий наліт  | відсутній або дуже слабкий           | 1   |
| 11 | Колос: за положенням у просторі  | прямий                               | 1   |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)                                   | середня 81-110 см                    | 5   |
| 13 | Колос: кількість рядів   | два                                  | 1   |
| 14 | Колос: форма   | циліндрична                          | 5   |
| 15 | Колос: за щільністю  | нещільний                            | 3   |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків)   | середній                             | 2   |
| 17 | Остюки: довжина відносно колоса  | довші                                | 3   |
| 18 | Стрижень колосу: довжина першого сегменту  | довгий                               | 7   |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента  | слабкий                              | 3   |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)                          | від паралельного до ледь відхиленого | 2   |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки              | довша                                | 3   |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки  | довгі                                | 2   |
| 23 | Зернівка: наявність плівки   | наявна                               | 9   |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке             | 1   |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски               | відсутнє або дуже слабке             | 1   |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної борізки   | відсутнє                             | 1   |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул   | фронтальне                           | 1   |
| 28 | Зернівка: забарвлення алеїронового шару  | сильно забарвлена                    | 3   |
| 29 | Тип розвитку   | ярий                                 | 3   |
| 30 | Остюки: наявність  | наявні                               | 9   |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення                              | остюки                               | 5   |
| 32 | Зернівка: форма  | еліптична                            | 3   |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски                                      | тонкозморшкувата                     | 1   |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски        | відсутнє                             | 9   |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка                         | поступовий                           | 2   |
| 36 | Вушка: форма верхівки  | шилоподібна                          | 3   |
| 37 | Вушка: охоплення соломини  | перекриваюче                         | 3   |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення  | середній                             | 5   |
| 39 | Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)                  | слабковиповнена                      | 3   |