

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту Парнас

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.07.2008

Патент №: 0870

Дата пріоритету: 30.11.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------------------|-----|
| 1 | Рослина: форма куща (габітус) | напівпрямостоячий | 3 |
| 2 | Нижні листки: опушення піхви | відсутнє | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | наявне | 9 |
| 4 | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок | помірна | 5 |
| 5 | Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком | багато | 7 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середнє | 5 |
| 8 | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків | наявне | 9 |
| 9 | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків | дуже сильне | 9 |
| 10 | Колос: восковий наліт | відсутній або дуже слабкий | 1 |
| 11 | Колос: за положенням у просторі | горизонтальний | 5 |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) | середня 81-110 см | 5 |
| 13 | Колос: кількість рядів | два | 1 |
| 14 | Колос: форма | циліндрична | 5 |
| 15 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 2 |
| 17 | Остюки: довжина відносно колоса | довші | 3 |
| 18 | Стрижень колосу: довжина першого сегменту | середній | 5 |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента | великий | 7 |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) | від паралельного до ледь відхиленого | 2 |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки | довша | 3 |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки | короткі | 1 |
| 23 | Зернівка: наявність плівки | наявна | 9 |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної борідки | відсутнє | 1 |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул | охоплююче | 2 |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару | слабко забарвлена | 2 |
| 29 | Тип розвитку | ярий | 3 |
| 30 | Остюки: наявність | наявні | 9 |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення | остюки | 5 |
| 32 | Зернівка: форма | видовжено-еліптична | 5 |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски | тонкозморшкувата | 1 |
| 34 | Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски | відсутнє | 9 |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка | поступовий | 2 |
| 36 | Вушка: форма верхівки | загострена | 2 |
| 37 | Вушка: охоплення соломини | перекриваюче | 3 |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення | середній | 5 |
| 39 | Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом) | слабковиповнена | 3 |