

Заявка №: 04012025

Вид: Ячмінь

Hordeum vulgare L. sensu lato

Назва сорту Серпанок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.07.2008

Патент №: 0877

Дата пріоритету: 21.12.2004

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08159

| №  | Ознака   | Проявлення                           | Код |
|----|--|--------------------------------------|-----|
| 1  | Рослина: форма куща (габітус)  | напіврозлогий                        | 5   |
| 2  | Нижні листки: опушення піхви   | відсутнє                             | 1   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                                  | наявне                               | 9   |
| 4  | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок                  | помірна                              | 5   |
| 5  | Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком                              | мало                                 | 3   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві  | помірний                             | 5   |
| 7  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                            | середнє                              | 5   |
| 8  | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків                               | наявне                               | 9   |
| 9  | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків                           | помірне                              | 5   |
| 10 | Колос: восковий наліт  | відсутній або дуже слабкий           | 1   |
| 11 | Колос: за положенням у просторі  | горизонтальний                       | 5   |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)                                   | середня 81-110 см                    | 5   |
| 13 | Колос: кількість рядів   | два                                  | 1   |
| 14 | Колос: форма   | пірамідальна                         | 3   |
| 15 | Колос: за щільністю  | нещільний                            | 3   |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків)   | довгий                               | 3   |
| 17 | Остюки: довжина відносно колоса  | довші                                | 3   |
| 18 | Стрижень колосу: довжина першого сегменту  | середній                             | 5   |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента  | помірний                             | 5   |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)                          | від паралельного до ледь відхиленого | 2   |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки              | рівна                                | 2   |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки  | короткі                              | 1   |
| 23 | Зернівка: наявність плівки   | наявна                               | 9   |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | слабке                               | 3   |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски               | помірне                              | 5   |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної борідки   | відсутнє                             | 1   |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул   | охоплююче                            | 2   |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару  | слабко забарвлена                    | 2   |
| 29 | Тип розвитку   | ярий                                 | 3   |
| 30 | Остюки: наявність  | наявні                               | 9   |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення                              | остюки                               | 5   |
| 32 | Зернівка: форма  | видовжено-ромбічна                   | 9   |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски                                      | тонкозморшкувата                     | 1   |
| 34 | Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски        | відсутнє                             | 9   |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка                         | поступовий                           | 2   |
| 36 | Вушка: форма верхівки  | загострена                           | 2   |
| 37 | Вушка: охоплення соломини  | перекриваюче                         | 3   |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення  | довгий                               | 7   |
| 39 | Соломина: виповнення (розріз між основою колосу і верхнім вузлом)                  | слабковиповнена                      | 3   |