

Заявка №: 08004320

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту КВ1Ф401 x КВ1Г245

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.03.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09484

| №  | Ознака  | Проявлення                             | Код |
|----|---|--|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | помірне                                | 5   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки   | округла                                | 3   |
| 3  | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                               | від малого до середнього               | 4   |
| 4  | Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)                             | пряме                                  | 1   |
| 5  | Стебло: зигзагоподібність   | відсутня або дуже слабка               | 1   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | сильне                                 | 7   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)                                  | ранній                                 | 3   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)                 | від слабкого до помірного              | 4   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | слабке                                 | 3   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)     | від слабкого до помірного              | 4   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)  | від середньої щільності до щільного    | 6   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)                             | малий (5-25)                           | 3   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті   | від прямого до ледь відхиленого        | 2   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.   | від відсутньої або дуже малої до малої | 2   |
| 15 | Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)  | ранній                                 | 3   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку"  | наявне                                 | 9   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"  | помірна                                | 5   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)   | слабке                                 | 3   |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см                              | середня від 31 до 40                   | 5   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)                | від середньої до довгої                | 6   |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною   | середні                                | 5   |
| 22 | Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                                 | ознака не визначається                 | 0   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см           | середня від 126 до 150                 | 5   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини                           | мале                                   | 3   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см                              | середня від 8.1 до 10.0                | 5   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см  | від дуже короткої до короткої          | 2   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см   | середній (19-22)                       | 5   |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см  | від малого до середнього               | 4   |
| 29 | Качан: форма  | конусно-циліндрична                    | 2   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.  | мала від 9 до 14                       | 3   |
| 31 | Качан: тип зернини (в центральній третині качана)   | кременистий                            | 1   |
| 32 | Качан: колір верхівки зернини   | жовто-оранжевий                        | 4   |
| 33 | Качан: колір низу зернини   | оранжевий                              | 5   |

34 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня

відсутнє

1

35 Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня

ознака не визначається

0