

**Вид:** Цибуля городня *Allium cepa* L.

**Заявка № 17106002 Назва сорту:** Монастрел **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190676**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                 | Код | Примітка |
|------|--|----------------------------|-----|----------|
| 1    | Рослина: кількість листків на псевдостеблі   | середня                    | 5   |          |
| 2    | Листки: положення  | пряме                      | 1   |          |
| 3    | Листки: восковий наліт   | сильний                    | 7   |          |
| 4    | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення   | сильна                     | 7   |          |
| 5    | Листки: зігнутість   | відсутня або слабка        | 1   |          |
| 6,1  | Тільки сорти цибулі городньої: Листок: за довжиною   | короткий                   | 3   |          |
| 6,2  | Тільки сорти цибулі шалот: Листок: за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 7,1  | Тільки сорти цибулі городньої: Листок: діаметр   | малий                      | 3   |          |
| 7,2  | Тільки сорти цибулі шалот: Листок: діаметр   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 8    | Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)  | середнє                    | 5   |          |
| 9    | Тільки сорти цибулі городньої: Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)  | середній                   | 5   |          |
| 10   | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка   | 1   |          |
| 11   | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)  | відсутній або дуже слабкий | 1   |          |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: розмір  | середній                   | 5   |          |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулинка: розмір   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: за висотою  | низька                     | 3   |          |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулинка: за висотою   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: діаметр   | середній                   | 5   |          |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулинка: діаметр  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: відношення висота / діаметр   | середнє                    | 5   |          |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Цибулинка: відношення висота / діаметр  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 16   | Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра   | посередині                 | 2   |          |
| 17   | Цибулина/цибулинка: шийка за шириною   | вужька                     | 3   |          |
| 18   | Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)   | округла                    | 4   |          |
| 19   | Тільки сорти цибулі городньої: Цибулина: форма верхівки (як для 18)  | округла                    | 4   |          |
| 20   | Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)   | округла                    | 3   |          |
| 21   | Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання  | помірна                    | 5   |          |
| 22   | Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною  | середня                    | 5   |          |
| 23   | Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки   | червоне                    | 7   |          |
| 24   | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки                    | сильна                     | 7   |          |
| 25   | Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)  | пурпуровий                 | 8   |          |
| 26   | Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок  | червонувате                | 3   |          |
| 27   | Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг  | мала                       | 3   |          |
| 28   | Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини   | низький                    | 3   |          |
| 29   | Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за весняної сівби   | відсутня або дуже слабка   | 1   |          |
| 30   | Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за весняної сівби  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 31   | Тільки сорти цибулі городньої: Тенденція до стрілкування за сівби восени   | відсутня або дуже слабка   | 1   |          |
| 32   | Тільки сорти цибулі городньої: Час стрілкування за сівби восени  | пізній                     | 7   |          |
| 33   | Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)                               | дуже ранній                | 1   |          |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої: Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)  | ранній                     | 3   |          |
| 34,2 | Тільки сорти цибулі шалот: Час збиральної стиглості (як для 33)  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 35   | Час проростання за зберігання цибулин  | середній                   | 5   |          |
| 36   | Чоловіча стерильність  | відсутня або дуже низька   | 1   |          |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 65. Товарна врожайність, т/га – 60. Тривалість вегетації рослин, днів – 107. Маса цибулини, г – 160. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,1; загального цукру % – 8,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.