

Заявка №: 09004068

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту НП1941

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.04.2009

Свідчення про державну реєстрацію № 09680

| №  | Ознака  | Проявлення                  | Код |
|----|---|-----------------------------|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | сильне                      | 7   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки   | від загостреної до округлої | 2   |
| 3  | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                                | малий (6-25)                | 3   |
| 4  | Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)                              | пряме                       | 1   |
| 5  | Стебло: зигзагоподібність   | ознака не визначалась       | 0   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | помірне                     | 5   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)                                  | ранній                      | 3   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)                 | відсутнє або дуже слабке    | 1   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | слабке                      | 3   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)     | слабке                      | 3   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)  | середньої щільності         | 5   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)                             | малий (5-25)                | 3   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті   | ледь відхилене              | 3   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.   | мала від 5 до 15            | 3   |
| 15 | Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)  | ранній                      | 3   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку"  | наявне                      | 9   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"  | від слабкої до помірної     | 4   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)   | відсутнє або дуже слабке    | 1   |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см                              | від короткої до середньої   | 4   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)                | середня                     | 5   |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною   | короткі                     | 3   |
| 22 | Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                                 | середня від 126 до 150      | 5   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см           | ознака не визначається      | 0   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини                           | мале                        | 3   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см                              | середня від 8.1 до 10.0     | 5   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см  | коротка від 5,1 до 10       | 3   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см   | середній (19-22)            | 5   |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см  | від малого до середнього    | 4   |
| 29 | Качан: форма  | конусно-циліндрична         | 2   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.  | від малої до середньої      | 4   |
| 31 | Качан: тип зернини (в центральній третині качана)   | кременистий                 | 1   |
| 32 | Качан: колір верхівки зернини   | оранжевий                   | 5   |
| 33 | Качан: колір низу зернини   | оранжевий                   | 5   |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня  | відсутнє                    | 1   |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня  | ознака не визначається      | 0   |