

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 17130004 Назва сорту: Каррера **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190683

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
4	Листкова пластинка: часточковість	слабка	3	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	еліптична	4	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	опукла	3	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	високе	7	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	низьке	3	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	середній	5	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	наявна	9	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 3,5. Товарна врожайність, т/га – 3,1. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 24. Маса 1000 насінин, г – 9,2. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5,1. Вміст у листках: загального цукру, % – 17,5. Вміст у листках: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 19,0. Вміст у листках: нітратів, мг/100г с.р. – 160. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Peronospora spinaciae* Laub.) – 8; плямистість темно-оливкова (*Cladosporium macrocarpum* Preuss.) – 7; церкоспороз (*Cercospora spinaciae* Oud.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛПЗГр.