

Заявка №: 03004045

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Монкада

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію № 07193

| №  | Ознака                                                                                                    | Проявлення                 | Код |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви                                                              | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки                                                                             | округла                    | 3   |
| 3  | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                                | малий (6-25)               | 3   |
| 4  | Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)                              | ледь похиле                | 3   |
| 5  | Стебло: зигзагоподібність                                                                                 | слабка                     | 2   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів                                                        | помірне                    | 5   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)                                  | від раннього до середнього | 4   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)                 | ознака не визначалась      | 0   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | слабке                     | 3   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)     | слабке                     | 3   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)                                            | середньої щільності        | 5   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)                             | середній (26-50)           | 5   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті                                                 | похиле                     | 5   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.                                                           | мала від 5 до 15           | 3   |
| 15 | Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)                                                                  | від раннього до середнього | 4   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку"                                                                    | наявне                     | 9   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"                                                    | слабка                     | 3   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)                                           | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см                              | середня від 31 до 40       | 5   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)                | коротка                    | 3   |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною                                                                         | середні                    | 5   |
| 22 | Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                                 | ознака не визначається     | 0   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см           | середня від 126 до 150     | 5   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини                           | середнє                    | 5   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см                              | середня від 8.1 до 10.0    | 5   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см                                                                              | коротка від 5,1 до 10      | 3   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см                                                                     | довгий (23-26)             | 7   |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см                                                                            | середній від 3,1 до 4,0    | 5   |
| 29 | Качан: форма                                                                                              | конусно-циліндрична        | 2   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.                                                                      | мала від 9 до 14           | 3   |
| 31 | Качан: тип зернини (в центральній третині качана)                                                         | кременистоподібний         | 2   |
| 32 | Качан: колір верхівки зернини                                                                             | жовто-оранжевий            | 4   |
| 33 | Качан: колір низу зернини                                                                                 | жовтий                     | 3   |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                                                              | наявне                     | 9   |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня                                              | помірна                    | 5   |