

Патент №: 06159

Заявка № 97031003

Вид: Картопля

Solanum tuberosum L.

Назва сорту Вінета

Дата державної реєстрації права: 01.01.06

Дата пріоритету: 27.03.97

Власник(и): Державне підприємство "Россортнаслідковоч"

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|-------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: розмір | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: за формою | сферичний | 1 |
| 3 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення основи | синьо-фіолетове | 2 |
| 4 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | помірна | 5 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | сильне | 7 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки | велика | 7 |
| 7 | Світловий паросток: тип росту верхівки | проміжний | 5 |
| 8 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки | дуже слабка | 1 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | сильне | 7 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих горбків | середня | 5 |
| 11 | Світловий паросток: ступінь виявлення горбків сочевичок | помірні | 5 |
| 12 | Світловий паросток: довжина бокових паростків | короткі | 3 |
| 13 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 14 | Рослина: тип | проміжний | 2 |
| 15 | Рослина: форма куща (габітус) | напівпрямий | 5 |
| 16 | Стебло: за товщиною головного стебла | тонке | 3 |
| 17 | Стебло: поширення антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 18 | Листок: за розміром | маленький | 3 |
| 19 | Листок: за обрисом | проміжний | 5 |
| 20 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | світлий | 3 |
| 21 | Листок: поширення антоціанового забарвлення центральної жилки | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 22 | Частка листка: за розміром | середня | 5 |
| 23 | Частка листка: за шириною | середня | 5 |
| 24 | Частка листка: здатність до зміни форми | низька | 3 |
| 25 | Частка листка: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 26 | Частка листка: глибина жилок | мілкі | 3 |
| 27 | Частка листочка: антоціанова пігментація пластинки верхівкової частки | відсутня | 1 |
| 28 | Частка листка: глянуватість верхньої сторони | тьмяна | 3 |
| 29 | Листок: (центральна жилка) частота та утворення вторинних часточок | середня | 5 |
| 30 | Кінцева частка: частота утворення вторинних часточок | середня | 5 |
| 31 | Бокова частка: частота утворення вторинних часточок | нульова або дуже низька | 1 |
| 32 | Бокова частка: розмір вторинних часток | маленькі | 3 |
| 33 | Суцвіття: за розміром | маленьке | 3 |
| 34 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 35 | Рослина: рясність квіток | помірна | 5 |
| 36 | Квітка: антоціанове забарвлення пуп'янка | відсутнє або дуже слабе | 1 |
| 37 | Віночок квітки: за розміром | середній | 5 |
| 38 | Віночок квітки: забарвлення внутрішньої сторони | біле | 1 |
| 39 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішньої сторони забарвленої квітки | ознака не визначена | 0 |
| 40 | Віночок квітки: антоціанове забарвлення зовнішньої сторони білої квітки | відсутнє | 1 |
| 41 | Віночок квітки: розмір білої верхівки забарвленої квітки | ознака не визначена | 0 |
| 42 | Рослина: рясність ягід | мала | 3 |
| 43 | Рослина: час досягання | дуже раннє | 1 |

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 44 | Бульба: форма | округла | 1 |
| 45 | Бульба: глибина вічок | неглибокі | 3 |
| 46 | Бульба: поверхня шкірки | гладенька | 3 |
| 47 | Бульба: забарвлення шкірки | жовте | 1 |
| 48 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 1 |
| 49 | Бульба: забарвлення м'якуша | світло-жовте | 3 |
| 50 | Лише сорти з жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під дією світла | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 51 | Стебло: форма у поперечному розрізі | тригранна | 1 |
| 52 | Пиляки: забарвлення | жовте | 3 |
| 53 | Ягода: форма | округла | 1 |