

Патент №: 06177 Заявка № 04028012

Вид: Капуста білоголова

Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Назва сорту Граната F1

Дата державної реєстрації права: 01.01.06

Дата пріоритету: 13.04.04

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Біоальянс"

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: колір сім'ядолей	світло-зелений	2
3	Рослина: за висотою, см	середня (16-20)	5
4	Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками), см	великий (>71)	7
5	Рослина: довжина зовнішнього качана, см	середня (16-20)	5
6	Рослина: положення зовнішніх листків	піднесене	5
7	Зовнішній листок: наявність черешка	наявний	9
8	Зовнішній листок: довжина черешка, см	середня (10-15)	5
9	Зовнішні листки: за розміром	середні	5
10	Зовнішній листок: форма пластинки	широкоеліптична	1
11	Зовнішній листок: профіль верхньої сторони пластинки	увігнутий	1
12	Зовнішні листки: наявність пухирчастості	слабка	3
13	Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
14	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
15	Зовнішній листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
16	Зовнішній листок: інтенсивність воскового нальоту	помірний	5
17	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
18	Зовнішній листок: наявність зубчастості	відсутня	1
19	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
20	Головка: форма поздовжнього розрізу	округло-плеската	2
21	Головка: форма основи поздовжнього розрізу	рівна	2
22	Головка: за довжиною, см	довга (>21)	7
23	Головка: за діаметром, см	середня (16-25)	5
24	Головка: розміщення найбільшого діаметра	в середині	2
25	Головка: ступінь покриття	покрита	3
26	Головка: вигин покривних листків	наявний	9
27	Головка: забарвлення покривних листків	зелене	2
28	Головка: інтенсивність забарвлення покривних листків	помірна	5
29	Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
30	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
31	Головка: щільність	дуже щільна	9
32	Головка: внутрішня структура	середня	5
33	Головка: за довжиною внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
36	Стійкість до раси I <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	наявна	9