

7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 278-282 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 62,5 ц/га, Лісостепу 64,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,3 ц/га, Лісостепу 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,2-13,9% білка, клейковини — 26,7-27,9%, сила борошна — 320-360 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1170 мл. Цінна пшениця.

® 04007022 Краплина

Заявник: Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 78 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 277 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 61,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 35,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,1% білка, клейковини 30,2%, сила борошна 347о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1020 мл. Сильна пшениця.

® 04007002 Кобіра

Заявник: Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із слабким восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньозігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-92 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 282-294 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 53,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 37,5-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 12,6-14,2% білка, клейковини — 25,8-30,4%, сила борошна — 261-277 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 970-1060 мл. Цінна пшениця.