

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — дворучка (альтернативний). Куш — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солон'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування нижчесередня-низька, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 7,7 бала. Рекомендовано висівати у озимому посіві в кінці строків посіву озимини. Вимагає ранньої весняної сівби, можна висівати у „лютневі вікна”. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 7,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 286 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,6% білка, клейковини — 27,9%, сила борошна — 375 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100 мл. Цінна пшениця.

Пшениця тверда озима

® 04008002 Кассіопея

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Власник(и): Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Куш - прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листовій пластинці з нижнього боку. Остюки світлоричневого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабе опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, циліндричної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при досяганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 78-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 270-278 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,7 ц/га, Лісостепу 51,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,8 ц/га, Лісостепу — 2,6 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-43,6 г. Зерно містить 13,5-14,5% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

® 05008001 Континент

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та листовій пластинці з нижнього боку. Остюки білого кольору з слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має помірний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, пірамідальної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при досяганні і має сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече скошене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий.

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 270-280 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,8 ц/га, Лісостепу 51,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,7 ц/га, Лісостепу — 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-43,2 г. Зерно містить 14,3% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

ЖИТО ОЗИМЕ

04003004 Купалинка

Заявник: Республіканське унітарне підприємство "Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по землеробству"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середня за висотою, форма куща напіврозлога. Колеоптиле короткий за довжиною із слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листовою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос короткий, нещільний, має похиле положенням в просторі та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 51,3 ц/га. Гарантована прибавка 3,5 ц/га. Вегетаційний період 270 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкість до вилягання 7,9 балів, осипання 7,9 балів, засухи 7,5 балів. Число падіння 213. Вміст білку 9,9%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 50,1 ц/га. Гарантована прибавка 0,2 ц/га. Вегетаційний період 289 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, снігової плісняви. Стійкий до вилягання, осипання. Число падіння 202. Вміст білку 9,8%. Сорт відноситься до вищесередньої і підвищеної групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 05003002 Слобожанець F1

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, низька, форма куща напівпрямостояча. Колеоптиле короткий за довжиною із слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листовою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та вузьку листову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та помірно опушення під колосом. Колос середньої довжини, середньої щільності, має напівпохиле положенням в просторі та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини із світлим забарвленням алейронового шару.