

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 49,1 ц/га., гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання, осипання. Число падіння 238. Вміст білку 10,8%.
Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 53,3 ц/га. Гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вегетаційний період 280 днів. Сорт стійкий до хвороб, борошнистої роси, бурої іржі, снігової плісняви. Стійкий до осипання, засухи. Число падіння 222. Вміст білку 9,4%. Сорт відноситься до вищесередньої і підвищеної групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Тритикале озиме

04011008 Валентин 90

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, куц — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, широкий та довгий, пірамідальної форми з напівпонижним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшувата.

Висота рослин 102-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 280-295 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,7 ц/га, Полісся 52,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 9,6 ц/га, Полісся — 3,9 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4-46,5 г. Зерно містить 12,6-13,0% білка.

05011011 Дон

Заявник: Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослина: за висотою дуже низька, куц — напівпрямий. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок слабе, восковий наліт на піхві сильний, листкова пластинка коротка та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу довга. Соломина: середньо виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середній за щільністю, середній за довжиною, циліндричної форми з горизонтальним положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок: має середню кількість квіток. Зернівка: світло-коричнева, середня, яйцеподібна, гладенька.

Висота рослини 77-80 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,9 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 268-295 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 52,7 ц/га, у зоні Лісостепу 61,6 ц/га, у зоні Полісся 46,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 7,4 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4-43,3 г. Зерно містить 13,3-13,5% білка.