

® 04011001 Інтерес

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, куц — прямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка середньої довжини та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабе, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, середньої довжини та вузький, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній, другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, зморшкувата.

Рослини заввишки 96-106 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 274-290 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 54,7 ц/га, Лісостепу 60,6 ц/га, Полісся 54,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,0 ц/га, Лісостепу — 5,5 ц/га, Полісся — 5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4-45,9 г. Зерно містить 13,3-13,7% білка.

05011009 Кологрів

Заявник: Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Рослина: за висотою низька, куц — прямий. Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок слабе, восковий наліт на піхві сильний, листкова пластинка коротка та середня. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу середня. Соломина: середньо виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середній за щільністю, середньої довжини, середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній, другий зубець малий. Колосок: має середню кількість квіток. Зернівка: коричнева, крупна, видовжена, зморшкувата.

Висота рослини 103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до посухи 8 балів. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 275 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 6,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,2 г. Зерно містить 12,5% білка.

® 04011010 Пурпурний

Заявник: Селянсько фермерське господарство "Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, куц — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середньої щільності, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в

просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшувата.

Висота рослин 102-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 280-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 57,4 ц/га, 51,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,3 ц/га, Полісся 2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 48,4-50,2 г. Зерно містить 13,6-13,9% білка.

® 04011004 Раритет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, куц — напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — середні. Соломина порожниста з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 279-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся — 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

Ячмінь озимий

® 04012019 Сейм

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, низькі. Прапорцевий листок з слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабе антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 3,0 ц/га. Вегетаційний період 260 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, та гельмінтоспориозу. Стійкий до осипання, вилягання, та засухи. Вміст білку 13,0%. В зоні