

просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшувата.

Висота рослин 102-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 280-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 57,4 ц/га, 51,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,3 ц/га, Полісся 2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 48,4-50,2 г. Зерно містить 13,6-13,9% білка.

® 04011004 Раритет

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, куц — напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабе, сизий восковий наліт на піхві — сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабе, довжина відносно колосу — середні. Соломина порожниста з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 279-292 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся — 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

Ячмінь озимий

® 04012019 Сейм

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, низькі. Прапорцевий листок з слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабе антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 3,0 ц/га. Вегетаційний період 260 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання, вилягання, та засухи. Вміст білку 13,0%. В зоні

Полісся середня урожайність сорту 50,3 ц/га. Гарантована прибавка врожаю 0,5 ц/га. Вегетаційний період 275 днів. Сорт стійкий до хвороб, борошнистої роси, бурої іржі. Стійкий до осипання, та засухи. Вміст білку 13,6%. Сорт відноситься до середньонижчої і середньої групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 05012005 Сіндерелла

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Власник(и): Дойче Заатферделунг АГ

Підтримувач(и):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, дуже низькі. Прапорцевий листок з сильним антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охоплює розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - короткий.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 55,4 ц/га., гарантована прибавка 1,1 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб бурої іржі. Стійкий до осипання, вилягання. Вміст білку 12,0%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 56,2 ц/га., гарантована прибавка 1,4 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, гельмінтоспориозу. Стійкий до осипання, вилягання, засухи. Вміст білку 12,1%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся 51,7 ц/га. Гарантована прибавка врожаю 1,9 ц/га. Вегетаційний період 268 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі. Стійкий до осипання, засухи, та вилягання. Вміст білку 12,5%. Сорт відноситься до нижчесередньої групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Ріпак озимий

® 04016002 Дема

Заявник: Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 32,3 ц/га, гарантована прибавка - 0,4 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,6, посухи - 8,4, осипання - 7,5 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаківим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюकोзинолатів - 0,8%. Вміст жиру - 46,3%, білку - 22,9%.