

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 33,9 ц/га. Вміст жиру – 44,3%, білку – 24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Зимостійкість – 6,9 бала.

Стійкість до вилягання – 8,7; посухи – 8,4; осипання – 7,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,5 балів.

### ® 04016010 Соло

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 28,4 ц/га, Полісся - 29,6 ц/га. Стійкість до вилягання 8,8-8,9, посухи 8,3-8,6, осипання 7,5-7,6 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,0-8,7 балів. Вміст ерукової кислоти 0,2%, глюкозинолатів 0,8%. Вміст жиру 45,6-46,0%, білку 20,9-21,8%.

### ® 04016011 Стілуца

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Час цвітіння - пізній. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Степу – 29,4 ц/га, Лісостепу – 27,4 ц/га. Стійкість до вилягання 8,4-9,0, посухи 7,8-8,3, осипання 7,4-7,8 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом 9,0, бактеріозом 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом 8,8-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти 0,3%, глюкозинолатів 0,8-0,9%. Вміст жиру 44,8-46,8%, білку 21,2-24,4%.

### 04016014 Триангель

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок довгий, середньої ширини з середньою кількістю часток. Довгий черешок листка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 36,7 ц/га, Лісостепу – 35,1 ц/га. Вміст жиру в межах 43,7-43,9%, білку – 22,2-24,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1-0,2%, глюкозинолатів – 0,7-0,8%.

Зимостійкість – 6,9 бала.

Стойкість до вилягання – 8,8; посухи – 8,0; осипання – 7,5 бала.

Стойкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стойкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

### 05016016 Токата

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,3 ц/га, Полісся - 37,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,4 і 1,2 ц/га. Стойкість до вилягання - 9,0; посухи - 8,3; осипання - 7,5 бала. Стойкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стойкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1-0,2%, глюкозинолатів - 0,7-0,8%. Вміст жиру - 45,3-47,6%, білку - 21,0-21,6%.