

Стойкість до вилягання – 8,8; посухи – 8,0; осипання – 7,5 бала.

Стойкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стойкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

05016016 Токата

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,3 ц/га, Полісся - 37,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,4 і 1,2 ц/га. Стойкість до вилягання - 9,0; посухи - 8,3; осипання - 7,5 бала. Стойкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стойкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1-0,2%, глюкозинолатів - 0,7-0,8%. Вміст жиру - 45,3-47,6%, білку - 21,0-21,6%.