

05012026 Бойос

Заявник: Плант Селект - товариство з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє або слабке, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, відсутня або слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок: середній.

Різновидність нутанс . Середньопізній , вегетаційний період 96 днів . Солома середньої висоти , 71 см .Сорт інтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 50,7 ц / га , що на 15,2 відсотки більше стандартів . Потенційна урожайність сорту 100 ц / га . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,5 % , екстрактивних речовин 80 % , плівчастість 8 - 9 % , вирівняність зерна 97 % . Стейкий до ураження борошнистою россою , гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 фф .

06012002 Беатрікс

Заявник: Заатен-Уніон ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна, за довжиною довші відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок – середній.

Різновидність медікум . Середньостиглий, вегетаційний період 93 - 97 днів . Стебло висотою 68 см , міцне . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 49,8 - 50,3 ц / га , що на 5,8 - 7,1 відсотка більше стандартів . Потенційна можливість сорту 95 ц / га . Сорт стейкий проти вилягання , осипання . Має відмінні пивоварні властивості . Білка має 11,0 - 11,7 % , екстрактивність 80 - 82 % , плівчастість 7-9 % , крохмалю 57 % , вирівняність зерна 96 % . Стейкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200фф .

05012019 Взірець

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):